

*A mon excellent frère et ami le Dr. Ethery Bey
Honneur de faire
confiance*

XVI CONGRÈS INTERNATIONAL DE MÉDECINE

29 AOÛT - 4 SEPTEMBRE 1968.

BUDAPEST

VIII SECTION de GYNECOLOGIE

TUMEURS DE PRÉCOCITÉ DES KYSTES DE L'OVAIRE

TORSIONS ET GROSSESSE

P. A. B.

Le Docteur A. N. PSALTOFF

CHIRURGIEN DE L'HÔPITAL HOLLANDAIS

CHIRURGIEN DE L'HÔPITAL HOLLANDAIS DE BUDAPEST

Imprimerie X. M. Vidari Local Konyag Szeged.

29 AOÛT - 4 SEPTEMBRE 1903.

BUDAPEST

VIII SECTION — « GYNECOLOGIE »

TORSION DU PÉDICULE DES KYSTES DE L'OVAIRE (1)

TORSION ET GROSSESSE

—

P. A. B.

Le Docteur A. N. PSALTOFF

CHIRURGIEN DE L'HÔPITAL MÉDICALE

CHIEF DES CLINIQUE GYNECOLOGIQUE ET MÉTRIC

La torsion du pédicule des kystes de l'ovaire est une complication assez fréquente et parfois très sérieuse, surtout lorsqu'elle se déclare au cours de la grossesse ou tout de suite après l'accouchement.

Dans une statistique personnelle de 37 cas de kyste de l'ovaire, opérés avec succès, au cours de ces dernières années, soit à l'Hôpital, soit à ma clinique privée, soit en ville, j'ai observé huit fois la torsion du pédicule.

Dans les deux cas, bien que la torsion fût multiple, je l'ai trouvée comme une surprise au cours de l'opération : les deux malades n'avaient présenté aucun signe antérieur qui eût pu faire soupçonner l'existence d'une telle complication.

indique que, sur sept cas, cinq fois, en faisant le toucher vaginal, nous avons trouvé, après la torsion, le *cul de sac antérieur* rempli par la tumeur. Nous considérons cela comme un symptôme qui peut rendre des services dans certains cas difficiles à diagnostiquer et nous croyons que ce phénomène est la conséquence des adhérences que le kyste contracte, pendant la torsion, avec les parois abdominales.

1) Hôpital hellénique St-Charalambos (*Feuille d'admission 2886*)

K. M. 30 ans, mariée, multipare etc.

Torsion du pédicule du kyste de l'ovaire gauche (2 fois)

Cul de sac antérieur plein.

Laparotomie. Guérison 8 Mai 1900.

2) Hôpital hellénique St-Charalambos (*Feuille d'admission 886*)

E. J. 45 ans, mariée, multipare etc.

Torsion du pédicule du kyste de l'ovaire gauche (2 fois)

Cul de sac antérieur libre.

Laparotomie. Guérison 7 Août 1902.

3) Hôpital hellénique St-Charalambos (*Feuille d'admission 1188*)

M. K. 40 ans, mariée, elle n'a jamais eu d'enfants.

Torsion du pédicule du kyste de l'ovaire droit (2 fois)

Cul de sac antérieur libre.

Laparotomie. Guérison le 4 Janvier 1904.

4) Hôpital hellénique St-Charalambos (*Feuille d'admission 2152*)

P. K. 40 ans, mariée, multipare etc.

Torsion du pédicule du kyste l'ovaire gauche (2 fois)

BULLETINS ET MEMOIRES
DE LA
SOCIÉTÉ DE CHIRURGIE
DE PARIS

(EXTRAIT)

Tumeur de la fosse iléaque droite, composée de plusieurs corps étrangers (fil rouge de soie, grilles, gramma, poublique, gramma etc.) adhérent à la dernière portion de l'intestin grêle; valvule iléo-cæcale.

PAR

G. F. Gallot

membre correspondant étranger

Les corps étrangers que l'on trouve arrêtés au fond, au niveau d'une valvule cœcocolique du gros intestin, ne sont pas rares (1-2) et nous connaissons tous la belle observation de Cruveilhier (3) qui, en faisant l'autopsie d'une femme (L. 213) de 38 ans morte d'époplexie, a trouvé un cancer situant sa base transverse au 618 centimètre de soie, arrêté au milieu de la valvule.

Dans le cas dont nous avons l'honneur de vous entretenir, il n'est pas question d'un néoplasme de l'intestin, mais tout simplement d'un arrêt de corps étrangers dans un diverticule de la dernière portion de l'intestin grêle, probablement de la valvule iléo-cœcale, de cause le cancer d'arrêt d'autres corps étrangers.

Notre valvule, après de longues recherches, était née de parents jouissant d'une parfaite santé, elle n'avait aucun anévrysme. Elle nous présentait

1) Cancer de l'intestin (corps étrangers). *Berlin de Gynecologie* 1905 J. Okyurek et Y. Gombier.

2) Bul. de la S. de Chirurgie, Jules Façon; occlusion par cancer du colon pelvique (Mé. rectocolonite); 1909 Février.

3) Cruveilhier. Anatomie pathologique du Corps humain Livre XXVI.